

GÉRER LA CHALEUR



- Distribuer de l'eau fraîche (citerne à l'ombre, purges, glace dans les bacs)
- Attention à l'accès à l'eau qui doit être suffisant
- Faire manger aux heures les plus fraîches (éclairer la nuit)
- Supplémentations : Aspirine – Vitamine C - Almaril
- Provoquer de la vitesse d'air sur les animaux
- Arroser les toits
- En cas de très forte chaleur, remettre de la lumière 1 à 2 h la nuit



LE MEILLEUR POUR LA NUTRITION ANIMALE




RÉUSSIR SON ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES



RÉUSSIR SON ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES

PRÉPARER LES POULETTES

Faire des pesées chaque semaine



DISTRIBUER AUX POUSSINS DE L'ALIMENT ET DE L'EAU PROPRE ET FRAÎCHE IMMÉDIATEMENT À LEUR ARRIVÉE

ALIMENT

- 100 individus / mangeoire
- Présence de **bandes de papier** durant les 3 premiers jours
/!\ Pas des montagnes d'aliment !
- **Recharger régulièrement** pour que l'aliment reste « frais »
- Pas de gamelles vides avant 10j → **accès à l'aliment en permanence.**
- **A partir de 10j, les poulettes doivent manger debout** = → **remonter les assiettes**
(la position couchée favorise le tri, diminue l'accès aux mangeoires et augmente le risque de se faire marcher dessus : griffures / nervosisme / lésions cutanées infectieuses...)

À VOLONTÉ, TOUTE LA JOURNÉE !

BOISSON

- Température d'eau entre 15 et 25°C
- **Nettoyage des bacs 1 à 2 fois/jr avec une éponge chlorée**
- **Purger + désinfecter** avec peroxyde ou chlore pour tuer les bactéries
- Remplir les abreuvoirs ou lignes de pipettes au dernier moment.

MATÉRIEL

- Au démarrage, prévoir du petit matériel bien réparti et accessible : **1 pipette pour 12 poussins**
Si utilisation des abreuvoirs adultes ronds alors il faut compléter avec des mini-abreuvoirs (1 pour 200 animaux) pendant 3 à 4 jours.
- **Mettre du matériel adulte assez tôt** en plus du matériel de démarrage (3-4 j)
- **Nettoyer régulièrement le matériel**

HYGIÈNE / SANTÉ



- **Vermifuger les animaux** 1 fois toutes les 6 semaines.
- **Ramasser les animaux morts** tous les jours et les stocker loin de l'élevage.
- **Penser à dératiser.**


DÉBECQUAGE

IL DOIT SE FAIRE À 2-3 MM DES NARINES ET NE DOIT PAS BLESSER LA LANGUE. Un débécage mal fait entraîne des difficultés de consommation de l'aliment et une mauvaise performance de ponte/un faible rendement de production.



TEMPÉRATURE AMBIANTE : 24°C

L'ALIMENTATION DES POULES PONDEUSES



DÉBUT DE PONTE

DE 18 À 30 SEMAINES

PRISE DE POIDS RAPIDE
MONTÉE EN CALIBRE
MAINTIEN L'INGÉRÉ

MILIEU DE PONTE

DE 31 À 50 SEMAINES

PONTE MAXIMALE
ADAPTATION DES APPORTS AU CALIBRE
ET AU POIDS
MAINTIEN DE L'EMPLUMEMENT

FIN DE PONTE

APRÈS 50 SEMAINES

PERSISTANCE DE PONTE
QUALITÉ DE LA COOUILLE

SI ŒUF CASSÉ

- **Bien faire le vide de chaîne**
- **Augmenter la quantité de calcium** dans la formule d'aliment



VIDE DE CHAÎNE

Un vide de chaîne bien fait doit durer **1 HEURE, PAS PLUS, PAS MOINS** et doit se faire aux **HEURES LES PLUS CHAUDES DE LA JOURNÉE.**

