


PESER ET SE SITUER SUR LA COURBE



À RETROUVER EN VIDÉO :
LA GESTION DU DÉMARRAGE EN POULET DE CHAIR

La phase
de démarrage



KENZ

Le meilleur pour la nutrition animale




RÉUSSIR SON ÉLEVAGE DE POULET



RÉUSSIR SON ÉLEVAGE DE POULET

LE DÉMARRAGE : L'ÉTAPE CLÉ

C'est la mise en place du potentiel de croissance et de la résistance de l'animal !



DISTRIBUER AUX POUSSINS DE L'ALIMENT ET DE L'EAU PROPRE ET FRAÎCHE IMMÉDIATEMENT À LEUR ARRIVÉE

ALIMENT

- 100 individus / mangeoire
- Présence de **bandes de papier** durant les 3 premiers jours
/!\ Pas des montagnes d'aliment !
- **Recharger régulièrement** pour que l'aliment reste « frais »
- Pas de gamelles vides avant 10j → **accès à l'aliment en permanence.**
- **A partir de 10j, les poulets doivent manger debout = → remonter les assiettes**
(la position couchée favorise le tri, diminue l'accès aux mangeoires et augmente le risque de se faire marcher dessus : griffures / nervosisme / lésions cutanées infectieuses...)
- Vide d'assiettes (pas complet et court pour faire manger les vitamines et oligos dans les fines)



À VOLONTÉ, TOUTE LA JOURNÉE !

BOISSON

- **Température d'eau entre 15 et 25°C**
- **Nettoyage des bacs 1 à 2 fois/jr avec une éponge chlorée**
- **Purger + désinfecter** avec peroxyde ou chlore pour tuer les bactéries
- Remplir les abreuvoirs ou lignes de pipettes au dernier moment.



MATÉRIEL



- **Au démarrage, prévoir du petit matériel bien réparti et accessible : 1 pipette pour 12 poussins**
Si utilisation des abreuvoirs adultes ronds alors il faut compléter avec des mini-abreuvoirs (1 pour 200 animaux) pendant 3 à 4 jours.
- **Mettre du matériel adulte assez tôt** en plus du matériel de démarrage (3-4 j)
- **Nettoyer régulièrement le matériel**


TRIER

Du 1^{er} jour au 10^{ème} jour → Faire du tri :
Boiteux, rachitiques, mal formés = réservoirs de microbes pour les autres poussins.
Ils constituent des non valeurs économiques qui diminuent le bénéfice du lot.

VÉRIFIER

Test du jabot plein

- 24 heures après arrivée > 95% des jabots pleins.
- Si on sent un jabot dur, les poussins ne boivent pas suffisamment.
- Si c'est trop liquide, la température est trop élevée



DONNER DU CONFORT AUX POUSSINS

BATIMENT



AGE j	Localisé		T°c Ambiante
	Sous éleveuse	gardes	
0-2	38-40	28-29	31-34*
3-6	36-38	26-28	28-30
7-9	34-35	25-27	27-29
10-12	33-30	25-27	26-28
13-15	32	25-26	25-26
16-18	30	25-26	24-25
19-21		24-23	24-23
22-25			23-21
26-30			20-21
31-35			19,5-21
>35			18-20

▪ **Préchauffer le bâtiment 24 h AVANT l'arrivée des poussins** pour atteindre une température ambiante 31°C et température litière à 28°C


▪ **Ventilation :** besoin de ventiler pour le renouvellement de l'air

ÉCLAIRAGE



- Intensité forte durant les premiers jours.
- Le premier jour 24h de lumière non-stop.
- Éclairage : éteindre la lumière au moins 4h par jour pour permettre une bonne ossification.

DENSITÉ



Respecter les densités en démarrage :

- 1 jour → 40 poussins/m²
- 4 jours → 35 poussins/m²
- 7 jours → 30 poussins/m²
- 10-11 jours → toute la surface du bâtiment



GÉRER LA CHALEUR

- Distribuer de l'eau fraîche (citerne à l'ombre, purges, glace dans les bacs)
- Attention à l'accès à l'eau qui doit être suffisant
- Faire manger aux heures les plus fraîches (éclairer la nuit)
- Supplémentations : Aspirine – Vitamine C
- Provoquer de la vitesse d'air sur les animaux
- Arroser les toits
- En cas de très forte chaleur, remettre de la lumière 1 à 2 h la nuit

